

KOLONOSKOPİ HAZIRLIĞI

Kolonoskopi neden yapılır, hangi hastalıklar teşhis edilir?

Kolonoskopi sayesinde bağırsak divertikülü, iltihabi bağırsak hastalığı, bağırsak kanseri vb. hastalıkların tanısı konulup, parça alınarak patolojik tetkikle ayırımı da gerçekleştirilebilir. Bu işlem sırasında, gerekiyorsa iç organların fotoğraflarının alınması mümkündür. Kolonoskopi iki amaçla kullanılır. Birincisi teşhis amacıyla; kalın bağırsağın içinde tümörel bir kitleden şüphelenildiğinde ya da makattan gelen kanamanın basit bir lezyon mu yoksa bir kanser oluşumu olup olmadığının teşhisinde yardımcı olmaktadır.

Kalın bağırsak kanserlerine büyük ölçüde polip denilen küçük ve iyi huylu olan urların yol açtığı bilinmektedir. Ancak, bu urlar zaman içinde kötü özellikler kazanabilmekte, yani kanserleşebilmektedirler. Kolonoskopi yardımı ile bunları çıkartmak ve hastayı takip etmek mümkün olmaktadır.

Randevu tarihinde hastaneye geldiğinizde bağırsaklarınız KOLONOSKOP denilen cihazla içten tetkik edilecektir. Bu işlemin yapılabilmesi için barsak temizliğinin yeterli olması gereklidir. Yetersiz hazırlandığınızda ve ilacı tarifen uygun kullanmadığınızda tetkikiniz yapılamayacaktır ve yeniden randevu almak zorunda kalacağınızdan zamanınız kaybolacaktır.

İŞLEM GÜNÜNDEN 3 (ÜÇ) GÜN ÖNCE/...../.....TARİHİNDE KATI İÇERMEYEN DİYET YAPILACAKTIR (TANESİZ ÇORBA, MEYVE SUYU, TANESİZ KOMPOSTO, YOĞURT, AYRAN, ÇAY...). Kesinlikle Ekmek, Sebze, Meyve yenilmemelidir.

1- 2 ADET X-M DİYET 250 ML SOLÜSYONU 2 LİTRE SU İÇERİSİNE KARIŞTIR.

2- HAZIRLANAN KARIŞIM/...../.....tarihinde Saat: 17'de içilmeye başlanıp her 10 dakikada bir su bardağı içilecek ve karışımın tamamı 1-2 saat içinde bitirilmeli. Saat 19:00'dan 22:00'e kadar bol su içilecek. Saat 24:00'den itibaren tetkike kadar hiçbir şey yenilip içilmeyecek.

3- Endoskopi randevusunu aldıktan sonra işleme gelmeden 1 hafta önce Eliza (Sarılık) testi için mutlaka kan verin. Sonuçları gelirken getirin.

- 4- Sürekli kullanmanız gereken ilaçlar (tansiyon, kalp) sabah 05:00'de az miktarda su ile alınmalıdır. Şeker ilaçları **alınmamalı!**...
- 5- Kan sulandırıcı ilaçlar (Coumadin, Fraxiparin, Plavix, Pingel.....) işlemden belirli bir süre önce bırakılması gerektiği için mutlaka doktorunuzla görüşünüz.
- 6- Romatizmal kalp hastalığı geçirmiş endokardit ve ameliyatı varsa mutlaka işlemden önce doktorunuza bilgi verilmesi gerekmektedir.
- 7- İşlem günü, işleme gelmeden evde **B.T. ENEMA 210 ml** lavman'ın tamamını makattan sıkıp, **30 dakika** bekleyip, tuvalete gitmelisiniz.

İLETİŞİM: 587 20 00 /2198

